

17
635
Cat
Jac

CATALOGUE

DE TOUS LES

VÉGÉTAUX EXOTIQUES

DE SERRE ET DE PLEIN AIR

DE L'ÉTABLISSEMENT

L. JACOB - MAKOV ET C^{IE},

RUE DE JOIE, PRÈS DE LA STATION DES GUILLEMINS

A LIÈGE (BELGIQUE)

**Dont la vente publique, sans aucune réserve et pour sortir d'indivision,
aura lieu à l'Établissement susdit, les 10 juin et jours suivants,
de 9 heures du matin à 3 heures de relevée,
par le ministère du notaire FRAIKIN.**

LIÈGE

IMPRIMERIE DE J. DESOER, LIBRAIRE

—
1861

BIBLIOTHÈQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

CATALOGUE

VÉGÉTAUX EXOTIQUES

DE STRAS ET DE PLEIN AIR

DE L'ÉTABLISSEMENT

L. JACOB - MAROT - ET C^{ie}

10, rue de la Vierge, 10, rue de la Vierge

A L'ÉCART (BELGIQUE)

Dans la vente publique sans aucune réserve et pour tout le monde
aura lieu à l'établissement susdit, les 10 juin et jours suivants
de 2 heures du matin à 3 heures de relevée
par la commission de notation TRAKIN.

LIÈGE

INTERMÉDIAIRE DE L'ÉCART - TERRAIN

1881

BIBLIOTHÈQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENEVE

BOT 39169

137



CATALOGUE

VÉGÉTAUX EXOTIQUES

DE SERRE ET DE PLEIN AIR

DE L'ÉTABLISSEMENT

L. JACOB-MAKOY ET C^{IE},

RUE DE JOIE, PRÈS DE LA STATION DES GUILLEMINES

A LIÈGE (BELGIQUE)

**Dont la vente publique, sans aucune réserve et pour sortir d'indivision,
aura lieu à l'Établissement susdit, les 10 juin et jours suivants,
de 9 heures du matin à 3 heures de relevée,
par le ministère du notaire FRAIKIN.**



LIÈGE

IMPRIMERIE DE J. DESOER, LIBRAIRE

1861



1871

VEGETABLE

BY JAMES H. HARRIS

NEW YORK: J. H. HARRIS, 1871.

THE VEGETABLE

is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables. It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables.

It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables. It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables.

It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables. It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables.

It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables. It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables.

It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables. It is a book which will be found to contain a full and complete description of the vegetable kingdom, and of the uses of the various plants and vegetables.

AVIS.

Pour sortir d'indivision , sera offert en vente provisoire le 16 mai 1861 et définitivement le 7 juin 1861 , à 10 heures du matin , devant M. Ophoven , juge de paix du second canton de la ville de Liège , en son bureau Mont-St-Martin , n° 17 , par le ministère du notaire FRAIKIN , à la requête des enfants et petit-enfant de M. L. JACOB-MAKOY , le célèbre établissement **L. JACOB-MAKOY et C^e** , situé rue de Joie , près de la station des Guillemins , à Liège (Belgique).

Cet établissement consiste :

1° En une jolie habitation avec bureau et autres bâtiments à l'usage de l'exploitation.

2° En 16 serres vitrées avec tous leurs appareils et accessoires.

3° En jardins et terrains garnis d'arbres fruitiers et de forts arbres et arbustes d'ornement. Les dits jardins jouissent non-seulement d'un air vif et pur , mais offrent encore une vue admirable sur la ville et les environs , qui sont si remarquables par leurs sites pittoresques.

Le tout forme un ensemble d'une surface d'un hectare 48 ares.

On est prié de s'adresser sur les lieux , pour la visite de l'établissement , et au notaire FRAIKIN , boulevard de la Sauvenière , n° 26 , à Liège (Belgique) , pour prendre connaissance du plan et des conditions de paiement pour l'achat de l'établissement , qui seront très-favorables à l'acquéreur.

Egalement à la requête des enfants et petit-enfant de M. L. JACOB-MAKOY , il sera procédé , par le ministère du notaire FRAIKIN , dans l'établissement susdit , les 10 juin et jours suivants , de 9 heures du matin à 3 heures de relevée , à la vente publique , sans aucune réserve , de tous les végétaux exotiques de serre ainsi que de plein air , cultivés en pot , dans l'ordre suivant :

Les 10 et 11 juin, on vendra les PLANTES DE SERRE FROIDE ET DE PLEINE TERRE EN POT.

Le 12 juin, les PLANTES DE SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Le 13 juin, les ORCHIDÉES ET FOUGÈRES.

Le 14 juin, les PALMIERS.

Le 15 juin, les AUTRES PLANTES NON ENCORE VENDUES.

En outre, tous les ouvrages périodiques ayant rapport aux plantes, comme : LA FLORE DE VAN HOUTTE;

LA PESCATOREA, OU ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES, par J. LINDEN ;

EDWARD'S BOTANICAL REGISTER ;

HOOKE'S ICONES PLANTARUM ;

FLORA JAPONICA, par P. F. DE SIEBOLD et ZUCCARINI ;

DESCRIPTION OF THE GENUS PINUS, ALSO OF THE FAMILY, OF CONIFERÆ, ILLUSTRATED WITH FIGURES, BY A. B. LAMBERT, ESQ. ;

LOUDON'S ARBORETUM et FRUTICETUM BRITANNICUM, figures coloriées ;

LINDLEY'S SERTUM ARCHIDACEUM, contenant 60 figures coloriées avec texte descriptif de 60 orchidées rares et belles ; ces figures sont faites par Miss Drake, peintre d'un talent merveilleux ;


THE ORCHIDACEÆ OF MEXICO ET GUATEMALA, BY J. BATERMAN, ESQ., contenant 40 splendides figures coloriées avec texte explicatif. Cet ouvrage admirable est extrêmement rare, n'ayant été tiré qu'à cent exemplaires ;

SERTUM BOTANICUM, publié à Bruxelles en 1828, 1829 et 1830, contenant plus de 600 figures de plantes, coloriées avec texte ; on y remarque Ardisia paniculata, Augusta glaucescens et oblongifolia, Barbacenia tricolor, Carlinea tomentosa, Caryocar nucifer, Cerbera Tanghin, Dionæa muscipula, Geoffroya surinamensis, Ferdinandusa elliptica et ovalis, Kielmeyera rosea, Napoleona imperialis, Parkia africana, Protea cynaroides, Myristica Moschata, Renanthera coccinea, Telopea speciosissima, Ventenatia glauca, Vanda Roxburghii cœrulea, 7 espèces de Vellozia, Vochysia pumila et sericea, Wittelsbachia insignis (Cochlospermum) etc., etc. ;

LE BOTANISTE CULTIVATEUR, par G. L. M. DUMONT, de Courset, avec supplément.

Toute série non épuisée à la séance fixée, sera continuée le lendemain.

Le 23 septembre 1861, de 9 heures du matin à 3 heures de relevée, seront vendus publiquement les plantes vivaces, arbres fruitiers et arbustes de plein air se trouvant actuellement en pleine terre, avec faculté, pour les acheteurs, de les laisser en place jusqu'au moment opportun pour leur déplantation.



ANMERKUNGEN.

Auseinandersetzung wegen, wird auf Anstehen der Kinder und Enkel von Herrn L. JACOB-MAKOY die beruehmte Handelsgärtnerei von **L. JACOB-MAKOY et Ce**, rue de Joie, zu Lüttich (Belgien) gelegen, provisorisch den 16 Mai 1861, und definitiv den 7 Juni 1861; Morgens zehn Uhr, unter Vorsitz des Herrn Ophoven Friedensrichter des zweiten Bezirks der Stadt Lüttich, in seiner Schreibstube Mont-St-Martin, n^o 17, durch den Notar FRAIKIN, zum öffentlichen Verkauf ausgedoten werden.

Dieselbe besteht :

1^o In einer hübschen Wohnung mit Bureau und andern Gebäulichkeiten zum Gebrauch des Geschäftes.

2^o In sechszehn Glashäuser nebst Zubehör und Geräthschaften.

3^o Gärten und Grundstücke mit Fruchtbäumen und starken Ziersträuchern bepflanzt, von wo aus man eine herrliche Aussicht auf die Stadt und die Umgebungen geniest.

Das Ganze bildet einen Flächeninhalt von einem hektar und 48 ares.

Man wird gebeten sich rue de Joie, nahe an der Eisenbahnstation der Guillemins zu Lüttich (Belgien), zu begeben, um die Handelsgärtnerei zu besehen, so wie sich an den Notar FRAIKIN, boulevard de la Sauvenière, n^o 26, zu wenden, um Einsicht des Plans und der Bedingungen zu nehmen, welche in Betreff der Zahlung fuer den Ankaeufer, sehr guenstig sind.

Ebenso wird auf Anstehen der Kinder und Enkel von Herrn L. JACOB MAKOY durch den Notar FRAIKIN, am 10 Juni 1861 und folgenden Tagen, von Morgens 9 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr, in der obenbenannten Handelsgärtnerei, ohne den geringsten Vorbehalt, zum öffentlichen Verkauf,

von allen Treibhauspflanzen so wie der Ziersträucher
fuers freie Land, welche in Toepfe gezogen sind, geschrit-
ten werden, in folgender Ordnung.

Am 10 und 11 juni, ALLE KALTEN GEWÄCHSHAUSPFLANZEN,
UND DIEJENIGEN FUERS FREIE LAND, WELCHE IN TOEPFEN gezogen
sind.

Am 12 juni, die WARMHAUSPFLANZEN.

Am 13 juni, die ORCHIDEES UND FARNKRÆUTER.

Am 14 juni, die PALMEN.

Am 15 juni, die UEBRIGEN NOCH NICHT VERKAUFTEN PFLANZEN.

Ausserdem noch einige periodische Gartenschriften, wie :
LA FLORE VON VAN HOUTTE;

PESCATOREA, EN ICONOGRAPHIE DER ORCHIDÉES, VON J. LINDEN;

EDWARD'S BOTANICAL REGISTER;

HOOKE'S ICONES PLANTARUM ;

FLORA JAPONICA VON P. F. VON SIEBOLD UND ZUCCARINI ;

DESCRIPTION OF THE GENUS PINUS, ALSO OF THE FAMILY OF
CONIFERÆ, ILLUSTRATED WITH FIGURS BY A. B. LAMBERT ESQ.

LOUDON'S ARBORETUM ET FRUTICETUM BRITANNICUM, coloured
figures ;

LINDLLEY'S SERTUM ORCHIDACEUM, enthaltend 60 colorirte
Abbildungen mit erklärendem Texte, von 60 schönen und
seltenen Orchidées;

THE ORCHIDACEÆ OF MEXICO ET GUATEMALA BY J. BATERMAN
ESQ. 40 herrliche colorirte Abbildungen mit erklärendem
Texte enthaltend, ist ausserordentlich selten, indem nur
hundert Exemplare abgedruckt worden sind.

SERTUM BOTANICUM, enthaltend mehr als 600 colorirte
Abbildungen mit Texte. Man bemerkt Ardisia paniculata,
Augusta glaucescens et oblongifolia. Carolinea tomentosa,
Ferdinandusa elliptica et ovalis, Renanthera coccinea,
Ventenatia glauca, 7 species von Vellozia, Wittelsbachia
insignis, etc., etc.

Yede Abtheilung welche an dem bestimmten Tage nicht
ganz vollendet ist, wird am folgenden, wieder angefangen.

Am 23 september 1861 von 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr
Nachmittags werden die Staudengewächse Fruchtbäume
und Ziersträucher welche im freien Land sind, öffentlich
verkauft werden, mit der Annehmlichkeit für die Ankäufer,
sie bis zur geeigneten Verpflanzungszeit dort zu lassen.



SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

- | | |
|---|--|
| ACACIA cornuta. | ARDISIA crispa <i>baccis albis</i> . |
| ABUTILON Maoneti. | — paniculata. |
| — C ^{se} de Médicis Spada. | — pumila, <i>nouvelle et superbe</i> . |
| ADENOCALYMNA racemosa. | ARDUINA grandiflora. |
| ADHATODA cydoniæfolia. | ARCTABOTHRYS odoratissima. |
| ÆSCHYNANTHUS cordifolius. | ARISTOLOCHIA leuconeura. |
| — fulgens. | — odoratissima. |
| — Lowi. | — Thwaitesi. |
| — Roxburghii. | ARTANTHE Rollissoni. |
| — splendidus. | — Warscewiczii. |
| — Teysmanni. | ARTOCARPUS incisa. |
| — tricolor. | — integrifolia. |
| AGALMYLA staminea. | — — <i>heterophylla</i> . |
| AGATOPHYLLUM aromaticum. | — Locucha. |
| — — <i>très-fort</i> . | — quercifolia. |
| ALLAMANDA violacea. | ASPARAGUS ruscifolius. |
| AMOORA Rohitua. | ASTRAPÆA Wallichii. |
| AMPHILOBIUM Mutisi. | BANISTERIA argentea. |
| ANAXAGORA javanica, <i>nouvelle et</i>
<i>superbe Anonacée</i> . | BEGONIA Ackermani. |
| ANDROMEDA species de Banka. | — Bernard-Léon. |
| ANTIARIS toxicaria. | — Bijou de Gand. |
| APHELANDRA Leopoldi. | — Charles Enke. |
| ARACHNOTHRIX rosea. | — — Wagner. |
| ARALIA argentea. | — C ^{te} A. de Limminghe. |
| — Browni. | — D ^{se} de Brabant. |
| — capitata. | — F. Dawans. |
| — elegans. | — J. Closon. |
| — guatemalensis. | — Kramerii. |
| — Hookeri. | — M ^{me} Stuart Low. |
| — Junghuniana. | — — Thibaut. |
| — leptophylla. | — nebulosa. |
| — Lindeni (palmata). | — Prés ^t van den Necke. |
| — macrophylla. | — P ^{se} Charlotte. |
| — nymphæifolia. | — — Alice. |
| — præmorsa (HEDERA emargi-
nata). | — rex leopardinus. |
| — reticulata. | — Prof. Lemaire. |
| ARDISIA crenulata <i>baccis albis</i> . | — Roi Léopold. |
| — crispa (Sieboldi). | — sanguinea atropurpurea. |
| | — Schœelleri. |
| | BIGNONIA buxifolia. |

- BIGNONIA marmorea.
 — Pareira.
 — Rollissoni.
 — species à fleur rose.
 BLEEKERIA calocarpa (LACTARIA).
 BLIGHIA sapida.
 BOEHMERIA argentea.
 BOUVARDIA brillant.
 — delicata.
 — Ghiesbrechtii.
 — Humboldti.
 BREXIA chrysophylla.
 BROWNEA Ariza.
 — capitellata.
 — coccinea.
 — erecta.
 — — *très-fort.*
 — grandiceps.
 — — *très-fort.*
 — leucantha.
 — — *très-fort.*
 — macrophylla.
 — princeps.
 — racemosa.
 CALOPHYLLUM Calaba.
 — inophyllum.
 CACTUS Epiphyllum cruentum
 — — albo-lateritium.
 — — purpureum.
 — — salmoneum.
 — — Snowi.
 — — spectabile.
 CAMPYLOBOTRYS argyroneura.
 — discolor.
 — regalis.
 — smaragdina.
 CANELLA alba.
 — laurifolia.
 CALYPTRARIA lævigata, *splendide
et nouvelle, d'une culture facile.*
 CARAPA discolor.
 — procera.
 CAROLINEA affinis.
 — fastuosa.
 — macrocarpa (PACHIRA longi-
folia.)
 — princeps.
 — tomentosa.
 CENTROPOGON grandiflorus.
 — Lucyanus.
 — variegatus.
 CEDRELA chromatica.
 — febrifuga.
 — odorata.
 CENTROSTEMMA punctatum.
 CERBERA laurifolia.
 — Tanghin.
 — fruticosa (KOPSIA).
 (CALPICARPIUM Roxburghii).
- CEPHALOTAXUS follicularis.
 CARLUDOVICA Liboni.
 — palmata.
 — palmæfolia.
 — plicata.
 CHAMBERLAYNIA spectabilis.
 CHRYSOPHYLLUM macrophyllum.
 — ferrugineum.
 CINCHONA Tucujensis, *nouvelle et
magnifique.*
 CISSUS porphyrophylla, *superbe.*
 CLERODENDRUM calamitosum, *blanc
odorant.*
 — cruentum, *nouveau à grande
fleur rouge sang.*
 — hastatum.
 CLUSIA Humboldti.
 — — *très-fort.*
 — superba.
 COCCOLOBA excoriata.
 — macrophylla.
 — majestica.
 — nymphæifolia.
 — pubescens.
 — uvifera.
 COLEA Commersoni.
 — floribunda.
 COLUMNEA erythrophæa.
 — scandens.
 COMBRETUM Pinceanum.
 CONOCLINIUM panamense.
 COOKIA pinnata.
 CORDIA glomerata.
 — superba.
 COSTUS elegans.
 CRATÆVA Tapia.
 CRESCENTIA Cujete.
 — macrophylla.
 CRINUM amabile.
 CROTON discolor.
 — longifolium *variegatum.*
 — pictum.
 — variegatum.
 CUPANIA panduræfolia.
 CURATELLA imperialis, *très-fort*
 (THEOPHRASTA).
 CUSPARIA febrifuga.
 CYCLANTHUS cristatus.
 CYANOPHYLLUM magnificum.
 CYRTOCERAS floribundum.
 DAMMARA orientalis.
 — — *alba.*
 — — — *très-fort.*
 DASYLIRION Acrotriche.
 — spirale, *très-fort*, espèce des
 plus ornementales et très-rare.
 DICHORISANDRA vittata cuprea.
 — — discolor nana.
 DIDYMOCARPUS bifloro-polyanthus.

- DIDYMOCARPUS polyanthus *fl. albo.*
 DILLENIA speciosa.
 DIONÆA muscipula, *attrape mouche*
 DIOSCOREA discolor.
 — — *zebrina.*
 DIOSPYROS ebenum.
 — argentea.
 — Embryopteris.
 DIPTERACANTHUS Herbsti.
 DORSTENIA asarifolia.
 DRACÆNA arborea *vera.*
 — — *angustifolia.*
 — Aubryana (thalioïdes), *nouvelle et charmante espèce du Gabon.*
 — cannaefolia.
 — cernua.
 — Draco.
 — elegans (spectabilis) (longifolia).
 — ensiformis.
 — ensifolia *vera.*
 — — *très-fort.*
 — flexilis (angustifolia).
 — Fontanesi.
 — esculenta (brasiliensis) (heliconiaefolia).
 — ferrea
 — — *versicolor.*
 — fragrantissima.
 — fragrans *latifolia.*
 — gracilis.
 — guatemalensis.
 — marginata.
 — — *latifolia.*
 — nobilis.
 — punctata.
 — rubra.
 — Rumphii.
 — Sieboldi (maculata).
 — umbraculifera.
 — — *très-fort.*
 DURIO zebethinus.
 ECHEVERIA campanulata.
 — fulgens.
 — gibbiflora.
 ECHITES Harrisii.
 — elliptica.
 — paniculata.
 — picta.
 ERANTHEMUM coccineum.
 — semperflorens.
 ERYTHROCHITON brasiliense.
 ERYTHROXYLON Jonghii.
 EUCHARIS amazonica.
 EUGENIA Mitchelli (Pitanga).
 — rubricaulis.
 — spectabilis.
 EUPHORIA Longan.
 EXOSTEMMA macrophylla.
 FAGRÆA auriculata.
 — lanceolata.
 — obovata.
 — zeylanica.
 FICUS amazonica.
 — barbata.
 — diversifolia.
 — elastica.
 — elliptica.
 — ferruginea.
 — Leopoldi.
 — melastomoïdes.
 — Neumanniana.
 — nymphæifolia.
 — pellucida.
 — religiosa.
 — rhododendrifolia.
 — Roxburghi (ARTOCARPUS im-
 perialis).
 — subpanduræformis.
 FIMENARIA platanifolia.
 FLINDERSIA australis.
 FOURCROYA longæva, *très-fort, superbe et très-rare.*
 FRANCISCEA eximia.
 — macrantha.
 GALACTODENDRON utile.
 GALIPEA odoratissima.
 — macrophylla (ERYTHROCHITON).
 GARCINIA Cowa (Mangostana de la Martinique).
 — Gutta (Cambogia).
 — ovata.
 GARDENIA citri-odora.
 — Planti.
 — Rothmanni.
 — Stanleyana.
 — Sherbourniæ.
 — Vogeli (africana).
 — Whitfieldi (maleifera).
 GASTONIA palmata.
 GEISSOMERIA aurantiaca.
 GENIPA americana.
 GEOFFROYA surinamensis.
 GESNERIA cinnabarina.
 — Donckelaari.
 — egregia.
 — Leopoldi.
 — gloxiniaeflora.
 — Duc de Brunswick.
 — Leichlini.
 — Miellesi.
 GLOXINIA Claude Lorrain *Hend.*
 — P^{ce} de Metternich.
 — erecta Adamas oculata.
 — — alba auriculata
 — — Cap^{ne} Capanema.
 — — C^{te} de Neipperg.

- GLOXINIA erecta Donizetti *Lemoine*
 — — D^{se} de Brabant.
 — — M^{me} Chantin.
 — — — A. Miellez.
 — — — A. Lebris *Lemoine*.
 — — — Desbordes-Valmore.
 — — — Thibaut *Lemoine*.
 — — Montaigne.
 — — Maria-Paulowna.
 — — Mars cœruleus.
 — — Minas Geraes.
 — — Phœbus *Lemoine*.
 — — P^{se} Alice.
 — — R^{ne} Stéphanie de Portugal.
 — — Roi des Belges.
 — — Roi Ferdinand de Portugal.
 — — rosea mutabilis.
 — — Rex igneus.
 — — Sierra da Estrella.
 — — Th. Lobb.
 — — Wagneri.
 GNETUM Gnemon.
 GOMPHIA Theophrasta.
 GONOCALYX pulcher.
 GORDONIA javanica.
 GUAREA trichilioïdes.
 GUAIAACUM officinale.
 GUSTAVIA augusta.
 — Leopoldi.
 HECHTIA Karwinskyana, *magnifique et très-rare*.
 HELICONIA metallica.
 — psittacina.
 — pulverulenta (farinosa).
 — species de Mirador.
 HERITIERA macrophylla.
 HERNANDIA sonora.
 HETEROCENTRON roseum.
 HEXACENTRIS mysorensis.
 — — lutea.
 HIPPOMANE longifolia.
 HOYA bella de Veitch.
 — campanulata.
 — fraterna.
 — imperialis.
 — Motoskei.
 — fruticosa (coccinea).
 — orbicularis.
 — picta.
 — Rumphii.
 — Teysmanni.
 — suaveolens.
 — variegata.
 — species de la côte méridionale du Java.
 — Vrieseana.
 HURA crepitans.
 HYMENAEA Courbaril.
 IMANTOPHYLLUM cyrtanthiflorum.

- IMANTOPHYLLUM miniatum.
 INGA alba grandiflora.
 — ferruginea (superbiens).
 — macrophylla.
 — quassiæfolia.
 IPOMÆA tyrianthina.
 IXORA acuminata de Kew.
 — — de Veitch.
 — Bandhuca.
 — javanica (speciosa).
 JACARANDA floribunda (Warscewiczii).
 JAMBOSA (EUGENIA).
 — amplexicaulis.
 — cauliflora.
 — formosa.
 — Korthalsii.
 — malaccensis.
 — orbicularis.
 JATROPHA multifida.
 — integerrima.
 JONESIA ASOCA.
 — scandens.
 LAPORTEA crenulata
 LAURUS canella.
 — Cinnamomum javanicum.
 — — Makoyanum, *très-robuste et magnifique nouveauté*.
 LINDENIA rivalis.
 LITSÆA macrophylla.
 LITTEA geminiflora (BONAPARTEA juncea).
 LOMATOPHYLLUM borbonicum.
 LUCUMA deliciosa.
 MANGIFERA indica, *très-fort*.
 MANGLIETIA glauca (MAGNOLIA).
 MARANTA alba-lineata.
 — argyræa.
 — coccinea floribunda.
 — Porteana.
 — regalis.
 — Warscewiczii.
 MEDINILLA eximia (Sieboldi).
 — magnifica.
 MELASTOMA atropurpurea.
 — speciosa.
 MELICocca bijuga.
 METRODorea atropurpurea.
 — stipularis.
 MEYENIA erecta.
 — — alba.
 MICHELIA champaca.
 — oblonga.
 MIKANIA Warscewiczii.
 MONOCERA grandiflora (ELOECARPUS lanceolata).
 MUSA Castilloni.
 — ensata.
 — Zebrina.

- MYRTUS filifolia.
 — melastomoïdes.
 — Pimenta.
 NAPOLEONA imperialis.
 NEMATANTHUS ionema (Moreli).
 NELITRIS species de Banka.
 NEPENTHES ampullacea.
 — lævis.
 — Rafflesiana.
 OREOPANAX dactylifolium, *Araliacée magnifique.*
 ORMOSIA emarginata.
 — superba.
 OXYANTHUS versicolor.
 PACHYSTIGMA pteleoïdes.
 PANDANOPHYLLUM humile, *nouvelle et superbe Cyperacée.*
 PANAX fruticosum (ARALIA).
 PARATROPIA elliptica.
 — farinifera.
 — Junghuneana.
 — longifolia.
 — pulchella.
 — parasitica.
 — scandens.
 — Teysmanni.
 — venulosa (ARALIA umbraculifera.)
 PASSIFLORA amabilis.
 — Beloti.
 — Cinnabarina.
 — Decaisneana.
 — Kermesina major.
 PEPEROMIA maculata.
 PETRÆ amplexicaulis, *nouvelle et très-belle espèce.*
 PHARUS scaber vittatus.
 PHRYNIUM discolor (HELICONIA.)
 PHYLLARTON Bojerianum.
 PINCENECTICIA glauca.
 — — *très-fort.*
 — gracilis.
 — longifolia.
 PILOCARPUS pinnatifidus.
 PITHECOLOBIUM latifolium.
 PLOCOSTEMMA lasianthum, *nouvelle Asclépiadée.*
 PLUMIERIA Rohani, *espèce aussi admirable que rare.*
 POLLIA purpurea, *nouvelle et superbe Commelynæ.*
 POLYGALA Hilariana.
 PORTLANDIA platantha.
 — rosea.
 POSOQUERIA longiflora.
 — platyphylla (spectabilis) (STANNIA formosa).
 PSYCHOTRIA leucocephala.
 — — *très-fort.*
 PSYCHOTRIA magnoliæfolia.
 — — *très-fort.*
 PTERIDOPHYLLUM zeylanicum.
 PTEROSPERMUM acerifolium.
 PUTZEYSIA rosea.
 QUASSIA amara.
 RHOPALA australis.
 — Caleyi.
 — complicata.
 — corcovadensis.
 — — *très-fort.*
 — crenata.
 — heterophylla.
 — — *très-fort.*
 — magnifica.
 — Jonghii.
 — — *très-fort.*
 — montana (elegans).
 — Porteana.
 — organensis.
 — — *très-fort.*
 — princeps, *très-fort.*
 — Skinneri.
 RHYNCHOSPERMUM jasminoïdes.
 RIVINIA tinctoria.
 RONDELETIA speciosa.
 SANSEVIERA fasciata.
 SAUROPUS indicus.
 SAPINDUS Saponaria.
 SAURAUJA mollis.
 SCHUBERTIA Kaefersteini.
 SIMABA ferruginea, *espèce très-rare et magnifique.*
 SIMARUBA excelsa.
 SINNINGHIA gloxiniaeflora.
 SMILAX marmorea du Ceylan.
 SONERILA margaritacea *superba.*
 SCIADOCARPUS Brongniarti.
 SORINDEIA madagascariensis.
 SPONDIAS Monbin (purpurea).
 SPATHODEA gigantea.
 — speciosa (lævis).
 SPHÆROSTEMMA marmorata, *magnifique nouveauté.*
 STADTMANNIA Estrellensis, *très-rare*
 — — *très-fort.*
 — Frazeri (glabra) (Urvillei) (geniculata).
 — — *très-fort.*
 — Jonghii.
 — — *très-fort.*
 — Legrellei, *très-rare et distinguée*
 — Liboni, *très-rare.*
 — pubescens (rugosa), *très-rare.*
 N. B. Tous les STADTMANNIA et RHOPALA sont remarquables.
 STEPHANOPHYSUM Baikiei.
 STERCULIA inops.
 — mexicana.

- STERCULIA villosa.
 STRAVADIUM (BARRINGTONIA).
 — insigne.
 — macrocarpum, *nouveau*.
 — racemosum.
 STRELITZIA augusta, *très-fort*.
 — reginæ.
 STROMANTHE sanguinea (MARANTA).
 SWARTZIA Flemingii.
 — Langsdorffii.
 SWIETENIA Mahagoni.
 TABERNÆMONTANA longiflora.
 TACSONIA ignea.
 TALAUMA Candollei (MAGNOLIA odoratissima).
 — fragrantissima (ovata)
 — mutabilis.
 — Plumieri.
 TERMINALIA mollis, *nouvelle et superbe*.
 THEOBROMA Cacao.
 THEOPHRASTA glauca.
 — Jussieui.
 — lanceolata, *très-rare et superbe*
 — — *très-fort*.
 — latifolia.
 — longifolia (CLAVIJA ornata).
 — macrophylla vera.
 — — *très-fort*.
 — ocanensis (minor).
- THIBAUDIA acuminata (macrophylla).
 — angustifolia.
 — elliptica.
 — pubescens.
 THUNBERGIA natalensis.
 THYRSAGANTHUS barlerioïdes.
 TRADESCANTIA fuscata.
 — discolor *vittata* (lineata.)
 — Warscewiczii.
 TRYALLIS brachystachys.
 TYDÆA bella *Laurentius*.
 — Bijou L.
 — Fortschritt L.
 — Goldfäsan L.
 — Harlequin L.
 — Lisette L.
 — meteor L.
 — perle des Tydæa L.
 — princeps L.
 — Rebecca L.
 URVILLEA ferruginea.
 UVARIA argentea, *nouvelle et superbe*.
 VALLEZIA Pao-paireiro.
 VILLAREZIA grandifolia.
 XANTHOCHYMUS pictorius.
 — ovalifolius.
 XANTHOXYLON species Gurharth.
 — bergerioïdes.

AROÏDÉES.

- ALOCASIA metallica, *nouveauté admirable*.
 AMORPHOPHALLUS campanulatus.
 (ARUM)
 ANTHURIUM amplum.
 — Augustinum.
 — Beyrichianum.
 — carthilagineum.
 — cordatum.
 — Erythropodum.
 — fissum.
 — Galeottianum.
 — Hookeri.
 — Humboldti (cardiophyllum).
 — intermedium.
 — Jonghii.
 — lucidum.
 — membranuliferum.
 — Olfersianum.
 — rubricaulé.
 — signatum.
 — Warscewiczii.
 ATACCIA cristata (TACCA integrifolia)
- ATACCIA pinnatifida (TACCA).
 CALADIUM argyrites.
 — albo-punctatissimum.
 — Baraquini.
 — Chantini.
 — hastatum.
 — marmoratum.
 — metallicum.
 — Neumanni.
 — poecile.
 — rotundifolium, *nouvelle espèce très-curieuse*.
 — Verschaffelti.
 COLOCASIA cochleata.
 — cucullata.
 — nymphæifolia.
 HÆMALONEMA cœrulea.
 — rubra.
 MASSOWIA cannæfolia.
 MONSTERA dimidiata (PHILODENDRON hederaceum).
 — Lennei (deliciosa) PHILODENDRON pertusum).

PHILODENDRON asperatum.

- bipinnatifidum.
- cannæfolium.
- crinipes.
- elegans.
- eximium.
- fenestratum.
- Fontanesi.
- giganteum.
- Imbe.
- pinnatifidum.

PHILODENDRON quercifolium (lace-
rum).

- Riedelianum.
- POTHOS argyræa.
- SAUROMATUM ferox.
- SCINDAPSUS glaucus.
- SOLENOSTERIGMA (PHILODENDRON).
- discolor.
- micans.
- SPATHIPHYLLUM Fredericksdali.
- lanceolatum.
- SYNGONIUM auritum.

BROMELIACÉES.

ÆCHMEA cœlestis.

- corallina.
- distichanta.
- farinosa (agglomerata).
- fulgens.
- — discolor.
- Melinoni.
- miniata.
- — discolor.
- rosea.
- spectabilis.
- Weibachi.

ANANASSA bracteata.

- penangensis, *foliis aureo mar-*
ginalis.

BILLBERGIA amæna.

- fasciata.
- gigantea.
- ianthina.
- iridifolia.
- Leopoldi.
- Liboniana.
- Lowi.
- miniata rosea.
- Moreliana.
- pyramidalis *bicolor.*
- splendida.
- thyrsoïdea.

BILLBERGIA Wioti.

- zebrina.
- BROMELIA septrum.
- CARAGUATA splendens.
- DISTEGANTHUS basilateralis.
- DYCKIA ramosa.
- remotiflora.
- ECHINOSTACHYS Pineliana.
- ENCHOLIRION Jonghi.
- NIDULARIUM fulgens.
- marmoratum.
- Scheremeteffi.
- splendens (BILLBERGIA Meyen-
dorffiana) (Carolineana).
- PITCAIRNEA Gireoudiana.
- undulata.
- PORTEA kermesina.
- POURRETIA floccosa.
- PUJA Funckeana.
- maïdifolia.
- recurvata.
- QUESNELIA rufa.
- TILLANDSIA carnea.
- dianthoïdea.
- vittata.
- VRIESIA calostachya, *très-rare.*
- speciosa (TILLANDSIA splendens)
- psittacina.

ORCHIDÉES.

ACANTOPHIPPIUM bicolor.

- ÆRIDES affine.
- crispum (Brookei).
- Fieldingi.
- Larpentæ.
- Lindleyanum.
- maculosum.
- odoratum (cornutum).

ÆRIDES odoratum, *très-fort.*

- odoratum majus.
- — niveum.
- — purpurascens.
- quinquevulnerum.
- roseum.
- suaveolens.
- suavissimum.

- ÆRIDES virens.
 ANÆCTOCHILUS intermedius.
 — Lobbianus.
 — Lowi.
 — setaceus.
 — — aureus.
 — vittatus (striatus).
 — xanthophyllus.
 ANGRÆCUM apiculatum.
 — bilobum.
 — caudatum.
 — Brongniarti.
 — eburneum.
 Anguloa Clowesi.
 — purpurea.
 ANSELLIA africana.
 — — *très-forte*.
 ARACHNANTHE moschifera (RENANTHERA).
 BRASSAVOLA Dighbyana.
 — glauca.
 — Perrini.
 BRASSIA Boissieri.
 — brachiata.
 — caudata.
 — guttata.
 — Keiliana.
 — maculata.
 — verrucosa.
 — Wagneriana.
 CALANTHE Domini, *nouvelle et très-belle*.
 — Veitchi, *nouvelle à fleur très-brillante magnifique*.
 CATTLEYA amethystina.
 — — punctata.
 — Arenbergi.
 — candida.
 — concolor.
 — guttata.
 — Halfordi.
 — labiata.
 — — atropurpurea.
 — Leopoldi.
 — — *très-forte*.
 — ianthina.
 — lobata.
 — Mossiæ.
 — — *superba*.
 — mutabilis.
 — Skinneri vera.
 — Wagneri.
 CHELONANTHERA speciosa.
 CHYSIS bractescens.
 — Limminghei.
 COELIA macrostachya.
 COELOGYNE Cumingi.
 — fimbriata.
 — fuliginosa.
 COELOGYNE intermedia.
 CYCNOCHES maculosum.
 CYMBIDIUM eburneum.
 — elegans.
 — ensifolium.
 — iridifolium.
 — pendulum.
 — pubescens.
 CYPRIPIEDUM barbatum.
 — — atropurpureum.
 — Fairieanum.
 — hirsutissimum.
 — Javanicum.
 — Veitchianum.
 — villosum.
 CYRTOCHILUM hastatum.
 — leucochilum.
 — maculatum.
 CYRTOPODIUM punctatum.
 — speciosum.
 DENDROBIUM aggregatum.
 — calceolaria.
 — — *très-fort*.
 — Cambridgeanum.
 — chrysanthum.
 — densiflorum.
 — — *très-fort*.
 — Farmeri.
 — — *album*.
 — Gibsoni.
 — moniliforme.
 — Griffithi.
 — nobile.
 — Pierardi majus.
 — Paxtoni.
 — Veitchianum.
 EPIDENDRUM aurantiacum.
 — macrochilum *album*.
 — Stamfordianum.
 ERIA ferruginea.
 — leucostachya.
 — floribunda.
 ERIOPSIS rutidobulbon.
 LÆLIA anceps.
 — — *Barkeriana*.
 — amabilis, *nouvelle et magnifique*.
 — crispa.
 — — *très-forte*.
 — — *purpurea*.
 — Perrini.
 — purpurata.
 — — *très-forte*.
 LYCASTE aromatica.
 — balsamea.
 — fulvescens.
 — macrophylla.
 — Skinneri.
 MAXILLARIA gracilis.

- | | |
|--|--|
| MAXILLARIA luteo-alba. | SOBRALIA decora. |
| — tenuifolia. | — macrantha. |
| MILTONIA bicolor. | — — <i>splendens</i> . |
| — candida. | SOPHRONITIS grandiflora. |
| — Clowesiana. | STANHOPEA aurantia. |
| — — <i>major</i> . | — Devoniensis. |
| — Moreliana. | — graveolens. |
| — spectabilis. | — Jenischi. |
| NEPHELAPHYLLUM pulchrum. | — insignis. |
| ODONTOGLOSSUM bicktoniense. | — inodora. |
| — citrosum. | — ecornuta. |
| — grande. | — Martiana. |
| — læve. | — oculata. |
| — pulchellum <i>grandiflorum</i> . | — saccata. |
| — Reichenheimi. | — tigrina. |
| ONCIDIUM altissimum. | — venusta. |
| — Carthaginense. | — Wardi. |
| — Cavendishianum. | Ces STANHOPEA sont également en |
| — flexuosum. | exemplaires énormes. |
| — incurvum. | TRICHOPILIA suavis. |
| — Lanceanum. | — marginata (coccinea). |
| — luridum. | — tortilis. |
| — Papilio. | TRICHOTOSIA ferox. |
| — — <i>majus</i> . | TRIGONIDIUM obtusum, <i>foliis aureo</i> |
| — phymatochilum. | <i>vittatis</i> . |
| — pulvinatum. | VANDA Batemanni. |
| — volubile. | — cœrulea. |
| — Wentworthianum. | — furva. |
| ORNITHIDIUM coccineum. | — insignis. |
| PERISTERIA elata. | — multiflora. |
| PHAJUS maculatus. | — Roxburghi. |
| PHALAENOPSIS grandiflora. | — — <i>cœrulea</i> . |
| RENANTHERA coccinea. | — suavis Rollisson. |
| — — <i>très-fort</i> . | — — <i>de Veitch</i> . |
| SACCOLABIUM Blumei. | — teres. |
| — — <i>majus</i> . | — tricolor. |
| — papillosum. | — — <i>cinnamomea</i> . |
| — retusum. | — — <i>Makoyana</i> . |
| — — <i>superbum</i> . | — — <i>meleagris</i> . |
| SARGANTHUS paniculatus. | — — <i>furcata, très-forte</i> . |
| — rostratus. | — — <i>superba</i> . |
| — teretifolius. | VANILLA africana. |
| SCHOMBURGKIA crispa, <i>très-forte</i> . | — aromatica. |
| — marginata. | WARSCIEWICZELLA radians (HUNT- |
| — rosea. | LEYA) (WARREA Wailesiana). |
| — tibicinis. | ZYGOPETALON crinitum. |
| — undulata. | — intermedium. |
| — — <i>très-fort</i> . | — Mackai. |

CYCADÉES.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| CYCAS circinalis. | CYCAS revoluta. |
| — — <i>très-fort</i> . | — — <i>très-fort</i> . |
| — glauca, <i>magnifique</i> . | — Rumphii, <i>magnifique</i> . |
| — — <i>très-fort</i> . | — — <i>très-fort</i> . |
| — linearis. | |

ZAMIA eriolepis (gigas).
 — horrida.
 — muricata.
 — — *très-fort.*


ZAMIA Skinneri (Lindleyana).
 — pumila.
 — tenuifolia (Fischeri).

PALMIERS.

ACROCOMIA sclerocarpa.
 ARECA alba.
 — Catechu.
 — horrida.
 — lutescens (HYOPHORBE indica).
 — — *très-fort.*
 — madagascariensis.
 — montana.
 — rubra.
 — Verschaffetti.
 ARENGA saccharifera.
 — — *très-fort.*
 ASTROCARYUM Chicon.
 — rostratum (mexicanum).
 — — *très-fort.*
 ATTALEA Cohune.
 — maracaïbensis.
 — speciosa.
 BACTRIS flavispina.
 CALAMUS asperrimus.
 — assamicus.
 — ciliaris.
 — coronarius.
 — Draco.
 — oblongus (niveus).
 — micranthus.
 — montanus, *très-fort.*
 — Rotang.
 — Rung-Dung.
 — tenuis.
 — Verschaffetti.
 — viminalis.
 CARYOTA excelsa.
 — fragilis.
 — Rumphii.
 — urens.
 CEROXYLON Andicola.
 — — *très-fort.*
 — niveum (DIPLOTHEMIUM caudescens).
 CHAMÆDorea atrovirens.
 — elatior.
 — Ernestia - Augustii (simplicifrons.) (GEONOMA latifrons).
 — fenestrata (GEONOMA).
 — gracilis.
 — lepidota (elegans) (velutina).
 — Sartori.
 — Schiedeana.

CHAMÆROPS Ghiesbrecti.
 — Martiana.
 — stauracantha.
 Cocos fernambucensis.
 — flexuosa.
 — lapidea.
 — schizophylla, *très-rare et magnifique.*
 — — *très-fort.*
 COPERNICIA Miraguana.
 CORYPHA Gebanga.
 — Guanacoa (THRINAX robusta) (CHAMÆROPS jatta) (SABAL Chappiana).
 DÆMONOROPS latispinus.
 — — *très-fort.*
 — spectabilis.
 — — *très-fort.*
 DIPLOTHEMIUM campestre, *très-fort*
 — maritimum.
 DRYMOPHLOEUS Zippelii, *très-fort.*
 ELÆIS guineensis.
 EUTERPE oleracea.
 — pisifera.
 GEONOMA pinnatifrons.
 GUILIELMA speciosa.
 LATANIA Commersoni.
 — glaucophylla.
 — rubra.
 — Verschaffetti.
 LICUALA elegans.
 — spinosa.
 LIVISTONA (LATANIA).
 — chinensis (borbonica).
 — — *très-fort.*
 — Jenkinsoni.
 — olivæformis.
 — rotundifolia (SARIBUS).
 MARTINEZIA caryotæfolia.
 MAURITIA Humboldtii.
 MAXIMILIANA gracilis.
 — regia.
 OREODOXIA Sanchona.
 PHOENIX farinifera.
 — — *très-fort.*
 — leonensis.
 — — *très-fort.*
 — myracensis.
 — sylvestris.

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.



PINANGA latisecta, <i>très-fort.</i>	THRINAX argentea.
PLECTOCOMIA assamica (ZALACCA).	— barbadensis, <i>très-rare et admirable.</i>
— elongata.	— — <i>très-fort.</i>
— spectabilis.	— Chantinii.
— — <i>très-fort.</i>	— elegans.
PTYCHOSPERMA appendiculata.	— graminifolia.
— Javanica.	— radiata.
SABAL Blackburniana, <i>très-fort.</i>	— tunicata.
— mexicana.	TRITHRINAX mauritiæformis.
— glaucescens.	WALLICHIA caryotoïdes.
— umbraculifera.	— porphyrocarpa (Orani) (ORANIA regalis).
SEAFORTHIA elegans.	
— — <i>très-fort.</i>	
STACHYOPHORBE Deckeriana.	

PANDANÉES.

FREYCINETIA nitida.	PANDANUS Thomsoni.
PANDANUS amaryllifolius.	— utilis.
— furcatus, <i>très-fort.</i>	— — <i>très-fort.</i>
— caricosus.	VINSONIA acuminata, <i>très-fort.</i>
— javanicus fol. var.	<i>Pandanée très-rare et magnifique.</i>
— graminifolius.	
— odoratissimus, <i>très-fort.</i>	

FOUGÈRES.

ACROSTICHUM lomarioïdes.	GONIOPHLEBIUM Reinwardti.
— viscosum.	— sub-auriculatum.
ANGIOPTERIS gigantea.	HEMIDICTION marginale (DIPLAZIUM giganteum, <i>très-fort.</i>
— hypoleuca.	GYMNOPTERIS nicotianæfolia.
— longifolia.	LONCHITIS excelsa.
— pruinosa.	— Ghiesbrecti.
— Willincki.	LYGODIUM circinatum.
ASPLENIUM Belangeri.	MARATTIA macrophylla.
— caudatum.	— microphylla.
BRAINEA insignis.	OLEANDRA hirtella.
CYRTOGONIUM repandum.	PLATYGERIUM grande (ACROSTICHUM).
DARÆA diversifolia.	— aleicorne, <i>très-fort.</i>
DICTYOGLOSSUM crinitum (ACROSTICHUM).	PTERIS argyræa.
DIPLAZIUM elegans.	— tricolor.
DRYNARIA coronans.	SAGENIA decurrens.
— diversifolia.	TODEA pellucida.
GLEICHENIA dichotoma.	
— flabellata.	



FOUGÈRES EN ARBRE.

ALSOPHILA australis.
 — radens.
 CIBOTIUM Schiedei.
 — — *très-fort.*

|| CYATHEA serra.
 || HEMITHELIA Humboldti, *très-forte.*
 || — integrifolia, *très-forte.*
 || DICKSONIA antarctica.

LYCOPODIACÉES.

LYCOPODIUM Phlegmaria longifo-	SELAGINELLA Lobbii.
lium.	— obtusa.
SELAGINELLA atroviridis.	— rubricaulis.
— cæsia arborea.	— umbrosa.
— circinalis.	— viticulosa.
— dichrous.	— Wallichi.
— lepidophylla.	



SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

-
- | | |
|---|---|
| ACACIA cultriformis (glaucophylla) | BANKSIA speciosa. |
| — lanuginosa. | — Solandri, <i>très-fort.</i> |
| — pubescens. | — spinulosa. |
| — pulchella <i>cycnorum.</i> | — verticillata. |
| — rotundifolia. | — virens. |
| — ulicina. | BEAUFORTIA splendens. |
| ACRADENIA Frankleni. | BEJARIA ledifolia. |
| ACROPHYLLUM venosum. | — densa. |
| AGAVEAM <i>fol. aureo marg.</i> | BERBERIS trifoliata. |
| — — <i>fol. luteo striatis.</i> | BESCHORNESIA yuccoïdes. |
| ADAMIA versicolor. | — — <i>très-fort.</i> |
| AGAPANTHUS intermedius. | BLANDFORDIA flammea. |
| — umb. maximus. | — longiflora <i>nouvelle.</i> |
| AGNOSTUS sinuatus (STENOCARPUS | BORONIA Drummundii. |
| Cunninghami). | — tetrandra. |
| — — integrifolius. | BUXUS citrifolia. |
| ALECTRYON excelsum. | CALLICARPA purpurea. |
| AMPHICOME Emodii. | CANNA Mulleri. |
| ARALIA crassifolia. | — Warscewiczi. |
| — heteromorpha <i>nouveau et très-</i> | — zebrina. |
| <i>beau.</i> | CAMPANULA Vidali. |
| — integrifolia. | CASTANOSPERMUM australe. |
| — papyrifera, <i>produit le papier</i> | CERATOSTEMA longiflorum (gran- |
| <i>de riz de la Chine.</i> | diflorum). |
| — quinquefolia. | CERATOPETALON gummiferum. |
| — Sieboldi. | CHAMÆBATIA foliosa. |
| — trifoliata. | CALCEOLARIA violacea. |
| — spathulata, <i>le seul exemplaire</i> | CHORIZEMA speciosa. |
| <i>en Europe.</i> | CITHAREXYLON cyanocarpon. |
| ARISTOLOCHIA sempervirens. | CHIRONIA floribunda. |
| ARBUTUS Menziesi. | CINNAMOMUM sericeum. |
| — californica. | — Maruba (brevifolium.) |
| BÆCKEA camphorosma. | CITRUS californica. |
| BANKSIA compar. | — grosso Bondoletto, <i>Citronier à</i> |
| — Cunninghami. | <i>fruit énorme.</i> |
| — foliosa. | — myrtifolia. |
| — integrifolia. | CLEMATIS lanuginosa. |
| — ilicifolia Loddiges. | — indivisa <i>lobata.</i> |
| — latifolia. | — trifoliata. |
| — pubescens. | CLETHRA ferruginea. |

- CLIVIA nobilis.
 COLLETIA cruciata (bictoniensis).
 CUPHEA eminens.
 — montana.
 CROWEA latifolia.
 — saligna.
 — stricta.
 CUNONIA capensis.
 DAPHNIDIUM gracile.
 DASYLIRION, species du Texas.
 DESFONTAINEA Hookeri (spinosa).
 — — *très-fort*.
 DIETES bicolor (IRIS).
 DORYANTHES excelsa, *très-fort*.
 DRACÆNA australis.
 — — *latifolia*.
 — congesta.
 — erythrorachis.
 — indivisa *Hortus*.
 — — *lineata*.
 — indivisa *vera*.
 — — *très-fort*.
 — rigidifolia.
 — Rumphii.
 — saccharifolia.
 — salicifolia.
 — stricta.
 — Veitchi.
 DRACOPHYLLUM Hugeli.
 DRIMIA lancifolia.
 DRIMYS chilensis.
 DROSERA binata.
 DRYANDRA armata.
 — longifolia.
 ECHEVERIA obovata.
 EDGORTHIA chrysantha.
 ELÆOCARPUS Heyni.
 EMBOETHRIUM coccineum.
 — lanceolatum.
 ENKIANTHUS macrophyllus.
 — longifolius.
 — quinqueflorus.
 — Smithi.
 EPACRIS multiflora.
 ESCALLONIA macrantha.
 — organensis.
 ERIOMYRTA virgata.
 EUGENIA myrtifolia.
 EURYBIA tomentosa.
 — ferruginea.
 FAGARA horrida.
 — piperita.
 FAGUS Cunninghami, *très-fort*.
 — Kubi.
 EUCALYPTUS coccifera.
 — cosmophylla.
 — glaucophylla.
 — pulverulenta.
 EUDESMIA tetragona.
 FARFUGIUM grande.
 FERDINANDA eminens.
 FICUS macrophylla *Desfont*.
 FOURCROYA gigantea.
 FUCHSIA C^{te} Cavour.
 — eclat.
 — fascination.
 — la crinoline.
 — Lord Clyde.
 — Sir C. Campbell.
 — Solférino.
 GARCINIA australis.
 GARDENIA floribunda *de Shanghaë*.
 — Lowi *de Shanghaë*.
 — radicans *major*.
 GARRYA macrophylla.
 GAZANIA splendens.
 GAULTHERIA organensis.
 GONOCALYX pulcher.
 GNIDIA pinifolia.
 GELONIUM, species du Japon.
 GREVILLEA Drummondii vera.
 — elegans (Dallachi).
 — flexuosa.
 — lavendulacea (rosea).
 — Perryana.
 — sericea.
 — robusta.
 — spartioides.
 GRISELINIA littoralis.
 — macrophylla.
 HAKEA heterophylla.
 — pectinata.
 — pinifolia.
 — pinnatifida.
 — Victoria.
 HIPPOMANE heterophylla.
 HELICHRYSUM Brucei.
 — macranthum purpureum.
 — rupestre grandiflorum.
 — sesamoides purpureum.
 — Woodsii.
 HIBBERTIA Readii.
 HOVEA lanigera (villosa).
 — purpurea.
 HUFELANDIA pendula.
 ILLICIUM anisatum.
 IOCHROMA warscewiczii.
 INDIGOFERA Roylei.
 KADSURA propinqua.
 KNIGHTIA excelsa.
 LANTANA. 15 nouvelles variétés.
 LAURELIA aromatica.
 LAPAGERIA rosea.
 LAMBERTIA echinata.
 — dubia.
 — formosa.
 LAURUS Camphora.
 — glauca du Japon.

- LAURUS graveolens.
 — glandulosa.
 — Persea (PERSEA gratissima).
 LARDIZABALA biternata.
 LEPTOSPERMUM recurvum.
 LEUCOPOGON floribundus (Richei).
 LIMONIA australis.
 LOMATIA anethifolia.
 — Bidwellii.
 — ferruginea.
 — heterophylla.
 — ilicifolia.
 — polyantha.
 — silaifolia.
 LUCULIA species de Himalaya.
 MAGNOLIA fuscata.
 MAHONIA Ehrenbergi.
 — nepalensis.
 — trifurcata.
 — tenuifolia.
 MARYANTHUS cœruleo-punctatus.
 MELALEUCA acrotrichoïdes.
 — gibbosa.
 — fulgens (splendens).
 MELICOPE simplicifolia.
 MIMUSOPS trifoliata.
 METROSIDEROS robusta.
 — florida *fol. eleg. var.*
 — linearis.
 MUTISIA Clematis.
 MYRICA edulis.
 MYRSINE undulata.
 MUSSCHIA Wollastoni.
 MYRRHINIUM purpureum.
 MYRTUS americana.
 — apiculata.
 — annularis.
 — bullata.
 — costaricensis.
 — polita.
 — Ugni de Veitch.
 NERIUM Oleander splendens giganteum pl.
 OLEA ilicifolia.
 PANAX arboreum (australasia).
 — Shefferiæ (ARALIA).
 PASSIFLORA Impératrice Eugénie.
 PELARGONIUM arboreum.
 PEUMUS Boldus (fragrans).
 PHILESIA buxifolia.
 PETROPHILA teretifolia.
 PHOENOCOMA prolifera *Barnesi*.
 PIMELEA elegans.
 — Neippergiana.
 — spectabilis.
 POLYMNIA grandis.
 POLYSPORA grandis.
 — axillaris.
 PROTEA hirsuta.
 — cynaroïdes.
 — mellifera.
 PUNICA granatum Legrellei.
 PRONAYA spectabilis.
 QUERCUS glabra.
 RHAMNUS chlorophora.
 RHODOLEIA Championi, *très-fort*.
 SAPIUM Drummundi.
 SCHIMA superba (GORDONIA).
 SALVIA albo-cœrulea.
 — barbata.
 — obtusa.
 — dielytroïdes.
 — tricolor.
 — Roemeriana.
 SCHOTIA speciosa.
 SMILAX maculata.
 — salsaparilla.
 STADMANNA australis.
 STATICE brassicæfolia, *nouvelle et florifère*.
 — Halfordi.
 — Reinwardi.
 STENOCARPUS salignus.
 STERCULIA diversifolia.
 STYPHELIA juniperoïdes.
 STYPANDRA frutescens.
 SYMPLOCOS japonica.
 TALAUMA pumila.
 TASMANNA aromatica.
 TECOMA Latrobei.
 TELOPEA speciosissima.
 TETRANTHERA japonica.
 — ferruginea.
 THEA assamica.
 — bohea.
 — camellioïdes *N. Baumann*.
 — viridis.
 THOMASIA prostrata.
 THYSANOTHUS proliferus.
 TWEEDIA cœrulea.
 VACCINIUM erythrinum.
 — Imrayi.
 — Sprengeli.
 VERONICA M^{me} Boucharlat.
 — Perthusezi.
 WIGANDIA caracasana.
 XANTHOSIA rotundifolia.
 ZIERIA macrophylla.
 YUCCA dracænoïdes.
 — Draconis *fol. var.*
 — — *très-fort*.
 — filifera.
 — quadricolor.
 — Verheyeni.
 XANTHORRHÆA hastilis.
 WEINMANNIA trichosperma.

RHODODENDRUM.

Aeruginosum.
 Acutilobum.
 Arboreum.
 Argenteum.
 Aucklandi (Griffithi).
 Barbatum.
 Blumei.
 Calophyllum.
 Camelliæflorum.
 Campylocarpum.
 Ciliatum.
 — *fol. aureo marginalis*.
 Crispiflorum.
 Dalhousiæ.
 Edgworthi.
 Eximium.
 Floribundum.
 Hodgsoni.

Hookeri.
 Jasminiflorum.
 Jenkinsi.
 Lancifolium.
 Longifolium.
 Maddeni.
 Nuttalli.
 Princess Royal Veitch.
 Retusum.
 Roylei.
 Tubiflorum.
 Thompsoni.
 Veitchi.
 Virgatum.
 Wighti.
 Windsori.
 — *leucanthum*.

CONIFÈRES.

ARAUCARIA Bidwelli.
 — — *très-fort*.
 — brasiliæna.
 — — *gracilis*.
 — Cooki.
 — Cunninghami.
 — — *très-fort*.
 — excelsa.
 — — *très-fort*.
 — excelsa *glauca*.
 — — *multiceps*.
 — *glauca* (Cunningh. *glauca*).
 ARTHROTAXIS Doniana.
 — Gunneana.
 CEPHALOTAXUS montana.
 CHAMÆCYPARIS *glauca*.
 — *thurifera*.
 CUPRESSUS Lindleyana.
 — *lusitanica fol. argenteo var.*
 — *Cashmirensis candicans*.
 DACRYDIUM cupressinoïdes.
 — cupressinum (*fuscum*).
 — cupressiforme.
 — elatum.
 — — *très-fort*.
 — Franklîni.
 — *glaucescens*.
 DAMMARA australis.
 — Bidwelli.
 — Browni.
 — *glauca*.
 — *orientalis*.
 — — *alba*.

DAMMARA *orientalis alba très-fort*.
 LARIX Kæmpferi (ABIES).
 LIBOCEDRUS Doniana (THUJA).
 PHYLLOCLADUS hypophylla (Cunninghami), *magnifique*.
 — rhomboïdalis.
 — trichomanoïdes.
 PINUS Greenvillei.
 — macrophylla.
 — Montezumæ.
 — palustris (*australis*).
 PODOCARPUS acicularis.
 — antarctica.
 — Blumei (*latifolia de Siebold*) (*zamiæfolia hort.*)
 — *bracteata, exemplaire très-fort et unique en Europe; la feuille est sucrée et aromatique*.
 — elongata.
 — cupressinoïdes (Horsfieldi).
 — japonicus *fol. eleg. var.*
 — lanceolata (Thunbergi).
 — macrophylla.
 — Purdieana.
 — salicifolia.
 — spicata (*ferruginea*) (DACRYDIUM *taxifolium*).
 — *zamiæfolia vera*.
 RETINISPORA ericoïdes.
 TORREYA Humboldti.
 WIDDRINGTONIA juniperoïdes (CUPRESSUS).

PALMIERS ET CYCADÉES.

CHAMÆROPS argentea.	LIVISTONA australis (CORYPHA).
— conduplicata.	— — <i>très-fort.</i>
— excelsa <i>Thunb.</i> (chinensis).	PHOENIX dactylifera.
— gracilis.	RHAPIS Kwanwon.
— humilis.	— Sierotsik.
— — arborescens.	SABAL Adansoni.
— hystrix.	— — <i>très-fort.</i>
— — <i>très-fort.</i>	— mexicana.
— Palmetto.	SEAFORTHIA elegans.
CYCAS revoluta.	— — <i>très-fort.</i>
DIOON edule.	Zamia muricata, <i>très-fort.</i>
JUBÆA spectabilis (Cocos chi- lensis).	

Une collection des meilleurs CAMELLIAS dont plusieurs en pyramide de 10 pieds.

Une collection d'AZALEA indica, dont une partie à haute tige et très-forte couronne.

ORANGERS : riche dépouille, Pampelm. Shadeck et à fruits amers, à haute tige et très-forte couronne.

LAURIERS très-forts, à haute tige et couronne.
— — en pyramide.

RHODODENDRUM hybrides d'arboreum, à haute tige et moyenne couronne.
— — — haute tige et très-large couronne.



PLANTES VIVACES.



ACANTHOLIMON glumaceum (STATICE Ararati).	PAEONIA albiflora grandiflora rosea <i>M. G.</i>
AUBRIETIA Mooreana.	— — Humei superba <i>L.</i>
— erubescens.	— — insignis <i>M. G.</i>
CAREX japonica <i>fol. varieg.</i>	— — Julia Grisi <i>F.</i>
CHELONE magnifica.	— — la Douceur <i>F.</i>
DELPHINIUM formosum.	— — Lola Montès <i>F.</i>
DIANTHUS altaïcus.	— — Luteciana <i>M. G.</i>
— Maulei.	— — M ^{me} Bréon <i>M. G.</i>
DIELYTRA cucullaris.	— — — Thilman <i>F.</i>
FARFUGIUM grande.	— — — de Blancas <i>F.</i>
FESTUCA glauca, <i>variabilis.</i>	— — maxima <i>M. G.</i>
GAILLARDIA grandiflora.	— — Miss Veverley <i>F.</i>
GYNERIUM argenteum.	— — Monique <i>F.</i>
HYPERICUM Ascyron.	— — Noémi <i>F.</i>
— balearicum.	— — Omer Pacha <i>F.</i>
LILIUM giganteum.	— — Poiteau <i>M. G.</i>
— speciosum.	— — Pottsii.
LINUM Lewisii.	— — purpurea superba <i>M. G.</i>
LYCHNIS Haageana (Sieboldi <i>fulgens</i>).	— — Reine Victoria <i>M. G.</i>
OENOTHERA taraxacifolia.	— — splendida <i>M. G.</i>
PAEONIA albiflora, ou de la Chine à fleurs pleines.	— — surpasse Pottsii <i>F.</i>
— — Abd-el-Kader, <i>Foul.</i>	— — triomphe de Paris <i>M. G.</i>
— — Alexandre Dumas <i>F.</i>	— — triomphe du Nord <i>Calot.</i>
— — belle du Mans <i>F.</i>	— — Victor Paquet <i>M. G.</i>
— — B ^{ne} Roussin <i>F.</i>	— — Washington <i>M. G.</i>
— — carnea elegans <i>M. G.</i>	PAPAVER bracteatum superbum.
— — Donoso Cortès <i>F.</i>	PENTSTEMON c ^{te} de Lambertye.
— — Duc de Cazes <i>M. G.</i>	— Ernst Benary.
— — D ^{se} d'Aumale <i>M. G.</i>	— Léonie Kien.
— — D ^{se} de Théba <i>F.</i>	— M. Perret.
— — elegans <i>M. G.</i>	— Liabaud.
— — Eugène Sue <i>F.</i>	— roseum grandiflorum.
— — festiva <i>Nobis.</i>	— surpasse rubrum magniflorum.
— — flavescens <i>M. G.</i>	— — prémice de Pantin.
— — Général Bosquet <i>F.</i>	— Victory.
— — — Paixhans <i>F.</i>	— W. Pfitzer.
— — Gloria Patriæ <i>F.</i>	PHLOX. 50 belles variétés anciennes.
— — grandiflora carnea <i>L.</i>	

PHLOX DECUSSATA, *superbes variétés de 1859.*

- PHLOX Ath. Bobine *F.*, rose vif à reflets saumonés.
 — Al. Bellet de Varennes *L.*, rose tendre, œil groseille.
 — Boule de neige *H. D.*, blanc très-pur et d'une belle forme, plante naine.
 — Docteur Boisduval *F.*, rouge saumoné.
 — Duguesclin *R.*, rose foncé centre mordoré.
 — Étoile du matin *Lemoine*, blanc large centre carmin violacé.
 — Evening Star *H.*, rose saumoné très-clair.
 — Jacques Callot *Lemoine*, rouge amarante.
 — Lord Byron *F.*, rose giroflée cocciné.
 — M^{me} de Chambry *L.*, rose Hortensia.
 — — Am. Pothier *L.*, rose tendre œil groseille, panicule pyramidale.
 — — Eug. Le Brasseur *L.*, blanc à centre carmin et lilas.
 — — Laurentius *Crousse*, très-large rose strié et veiné de blanc à centre rouge.
 — — Vilmorin *F.*, rose saumoné.
 — M. Punch *F.*, rose saumoné.
 — — Durdan *L.*, lilas violacé œil carmin.
 — — Kamm *R.*, rouge pourpre étoilé carmin, œil blanc.
 — — Rollisson *L.*, groseille vif saumoné.
 — Neptune *F.*, saumon clair.
 — Princesse de Bauveau *R.*, blanc de neige, énorme centre carmin vif.
 — Triomphe de Twickel, rouge amarante largement rubané blanc.
 — Victor Hugo *F.*, rose carminé, œil plus vif.

PHLOX DECUSSATA, *nouvelles variétés de 1860.*

- PHLOX Arthémise *Lemoine*, blanc mat pur forme parfaite.
 — Benjamin *R.*, blanc crème, large étoile rose vif.
 — Corinne *Lemoine*, très-grande fleur laque de Chine.
 — Docteur Lacroix *L.*, rouge cuivré de forme parfaite.
 — La Reine *R.*, blanc pur large étoile carminée.
 — Louis Lierval *L.*, rouge saumoné.
 — Louis Richard *R.*, pourpre vif centre carminé, nain.
 — M^{me} Le Boucher *F.*, rose violacé, large fleur parfaite.
 — — Schoubart *R.*, blanc auréole pourpre, œil blanc.
 — M^{lle} Anaïs Aubert *F.*, blanc large centre violet, très-grande fleur.
 — Maria Colmat *R.*, rose tendre, large étoile rose vif, nain.
 — M. Forget *F.*, très-grande fleur rouge violacé.
 — — Levassor *R.*, rouge vif éclatant, panicule énorme.
 — Prince Troubetzkoy *F.*, rose vif centre cocciné.
 — Sapho *Lemoine*, rose saumon carminé, forme parfaite et plante naine.
 — Victor-Emmanuel *Denis*, grande fleur couleur de chair centre rouge.

- PHYGELIUS capensis.
 PITHYROSPERMA acerifolium.
 PLUMBAGO Larpentæ.
 PYRETHRUM roseum duchesse de Brabant.
 — — P^{se} Charlotte.
 — — Tom Pouce.
 THYMUS candicans.
 TRITOMA Burchelli.
 — pumila.
 — Rooperi.
 — Uvaria.
 — — glauca.

- VINCA major fol. elegantiss. var.
 YUCCA arcuata.
 — aloëfolia purpurea.
 — — — major.
 — glaucescens.
 — gloriosa.
 — umbraculifera.
 — concava.
 — plicata.
 — tenuifolia.
 OEILLETS remontants, plusieurs collections superbes; cultivés en pots.

ARBRES ET ARBUSTES RUSTIQUES.

- ACER Neg. *fol. arg. var.*
 — *villosum.*
 ÆSCULUS Hipp. *fl. pl.*
 — — *laciniatum.*
 — — *Memmingeri.*
 ALNUS imperialis *aspleniifolia.*
 AMYGDALUS pumila *fl. albo pl.*
 ARALIA japonica.
 AZARA crassifolia.
 BERBERIS concinna.
 — Darwinii.
 — dealbata.
 — empetrifolia.
 — Fortuneana (MAHONIA).
 — Hookeri.
 — microphylla *serratifolia.*
 — Neubertii.
 — vulg. *fol. purpureis.*
 BETULA tristis.
 BIGNONIA capreolata.
 — grandiflora.
 — radicans.
 — — *flava.*
 — — *atrosanguinea purpurea.*
 — — *punicea.*
 — Thunbergii.
 BUXUS longifolia, de la Chine.
 — rotundifolia, de la Chine.
 CALLICARPA japonica.
 CASTANEA vesca *filipendula.*
 CATALPA Bungei.
 CERCIS siliq. *fl. albo.*
 CLEMATIS francofurtensis.
 — Guascoii.
 — lanuginosa.
 — venosa.
 CLERODENDRUM Bungei.
 CORYLUS Avell *bond nut.*
 — — *fol. purpureis.*
 — — *merveille de Bollwiller.*
 — — *quercifolia.*
 COTONEASTER buxifolia.
 — microphylla.
 — rotundifolia.
 — Simondsi.
 — thymifolia.
 CRATÆGUS oxyac. *fl. rubro pl.*
 — *pyracantha japonica.*
 CYDONIA japonica.
 — — *Mallardii.*
 DEERINGIA Amherstiae *fol. var.*
 EDGEWORTHIA chrysantha.
 ELEAGNUS reflexa.
 EUONYMUS japonicus *fol. albo marg*
 — — *fol. aureo var.*
 FORSYTHIA suspensa.
 — viridissima.
 FRAXINUS californica.
 — oxyacanthifolia.
 — serratifolia.
 GARRYA elliptica.
 GLYCINE chinensis.
 — — *flore albo.*
 — frutescens *magnifica.*
 GLEDITSCHIA horrida.
 — *fol. purpureis.*
 — macrocanthos.
 HEDERA algeriensis.
 — Helix *fol. arg. var.*
 — — *maculata.*
 — hibernica *fol. eleg. var.*
 — macrophylla.
 — Rœgneriana.
 HYDRANGEA chinensis.
 — jap. *fol. arg. var.*
 — pubescens.
 ILEX cornuta.
 — Aquifolium, Houx panaché
 plusieurs variétés cultivée en
 pot.
 — Cunninghami.
 — Fortunei.
 — furcata.
 — latifolia.
 — latispina.
 — leptacantha.
 — microcarpa.
 — nobilis.
 — Tarajo.
 — trapeziformis.
 JASMINUM nudiflorum.
 JUGLANS regia *laciniata.*
 — — *monophylla.*
 — — *spicata.*
 LEYCESTERIA formosa.
 LIGUSTRUM buxifolium.
 — californicum.
 LONICERA brachypoda.
 — epsomensis.
 — Magnevillei.
 — sempervirens *superba.*
 — splendida.
 MAGNOLIA gigantea.
 — glauca *Thompsoniana.*
 — gracilis.
 — grandiflora.

- MAGNOLIA grandiflora *bullata*.
 — — *crispa*.
 — — *exoniensis*.
 — — *ferruginea*.
 — — *floribunda*.
 — — *gloriosa*.
 — — *longifolia*.
 — — *mayardiensis*.
 — — *rotundifolia*.
 — — *tomentosa*.
 — Norbertii.
 — purpurea.
 — — *nigricans* Rinz.
 — — *reflorescens* Rinz.
 — Soulangiana.
 — tripetala.
 MAHONIA (BERBERIS).
 — anemonifolia.
 — Aquif. *heteroph. varieg.*
 — Bealii.
 — fascicularis.
 — Fortuneana.
 — glumacea.
 — japonica.
 — pallida.
 — trifoliata *vera*.
 — trifurcata.
 MALUS Sieversiana.
 MORUS Kämpferi.
 NANDINA domestica.
 NATHALIA cerasiformis.
 OLEA ilicifolia.
 PAEONIA Moutan.
 — — comata *Nobis*.
 — — C^{te} de Flandres.
 — — Delachei.
 — — D^{se} d'Orléans.
 — — Dyonisii *Guérin*.
 — — Edwardsii *David*.
 — — Germanica *Siebold*.
 — — lactea *David*.
 — — Lambertinae *Nobis*.
 — — phœnicea.
 — — purpureo-violacea.
 — — Regia *Nobis*.
 — — rosea pleniss. *Nobis*.
 — — roseo-purpurea *Nobis*.
 — — superba de Young.
 — — triomphe de Malines.
 — — Victoria *Mathieu*.
 — papaveracea.
 — — alba pl. *Casoretti*.
 — — fimbriata carnea pl. *Casoretti*.
 — rubra odorata.
 — — M^{me} Stuart Low *Nobis*, fleur très-supérieure à Elisabethae.
 — — plenissima *Casoretti*.
 — — Rosa Mundi *Nobis*.
 PAVIA californica.
 PERSICA vulg. rubra pl.
 PHELODENDRON amurense.
 PHOTINIA serrata.
 PRUNUS Lauro-Cerasus *fol. var.*
 — — caucasica.
 — — sinensis *alba pl.*
 QUERCUS agrifolia.
 — heterophylla.
 — filicifolia.
 — laurifolia.
 — macrocarpa.
 — pyramidalis (fastigiata).
 RHAMNUS crocea.
 RIBES nigrum *asplenifolium*.
 — sanguineum pl.
 — — albidum.
 — — splendens *Tourrès*.
 — subvestitum.
 ROBINIA inermis fastigiata.
 — pseudo-acacia fastigiata.
 — — glaucescens.
 — — patula.
 — — revoluta.
 RUBUS leucodermis, fruit couleur jaune d'ambre.
 — rotundifolius.
 SKIMMIA japonica.
 SORBUS nana (sibirica).
 SPIRÆA californica.
 — cuneata.
 — Fortunei (callosa).
 — Hookeri.
 — Reevesi *fl. pl.*
 — Regelii.
 SYMPLOCOS japonica.
 SYRINGA Emodii.
 — Josikæa.
 — persica alba.
 — — nana pinnata.
 — sinensis alba.
 — vulg. alba virginalis.
 — — Philémon.
 — — rubra insignis.
 TAMARIX africana.
 — germanica.
 — indica.
 ULMUS monumentalis *Rinz*.
 VIBURNUM dilatatum.
 — macrocephalum.
 — plicatile.
 WEIGELIA hybrida.
 — hortensis *fl. rubro*.
 — Metelerkampii (amabilis).
 — — *fl. albo*.
 — — *fol. varieg.*
 — — Grænewegenii.
 — rosea *Desboisii*.
 Et d'autres arbustes plus communs.

CONIFÈRES RUSTIQUES.

ABIES canadensis.
 — cephalonica.
 — cilicica.
 — Douglassi.
 — eremita.
 — excelsa *nigra pumila*.
 — jezoensis.
 — Khutrow (Smithiana) (Morinda).
 — Wittmanniana.
 ARAUCARIA imbricata.
 ARTHROTAXIS cupressiformis
 CALLITRIS Quarii.
 CEDRUS Deodora.
 — — *crassifolia*.
 CEPHALOTAXUS adpressa (TAXUS tardiva) (TAXUS brevifolia).
 — drupacea Siebold. (PODOCARPUS nucifer Thunb) (TORREYA nucifera).
 — Fortunei mascula.
 — — foemina.
 — koraiensis (PODOCARPUS coreana Sieb.).
 — pedunculata (PODOCARPUS Harringtoni).
 — sinensis.
 CHAMÆCYPARIS thurifera.
 CRIPTOMERIA japonica.
 — — *fol. argentea* var.
 — — *araucarioïdes*.
 CUPRESSUS Corneyana (gracilis).
 — fastigiata *thujæfolia*.
 — flagelliformis.
 — Lawsoniana.
 — Lindleyana.
 — majestica.
 — occidentalis.
 — religiosa.
 — Skinneri (excelsa).
 FITZROYA patagonica.
 JUNIPERUS alpina.
 — argentea.
 — aromatica.
 — bacciformis.
 — bermudiana.
 — communis hibernica.
 — — — *compressa*.
 — — interrupta.
 — dealbata (occidentalis).
 — dioecia.
 — drupacea (ARCEUTHOS).
 — excelsa.
 — — *glauca*.
 — flaccida.

JUNIPERUS fragrans.
 — funebris.
 — gossainthaneana.
 — Japonica.
 — macrocarpa.
 — mexicana (Deppeana).
 — Oxyc. echiniformis.
 — phœnicea.
 — prostrata.
 — pyriformis.
 — recurva.
 — Reevesiana (flagelliformis).
 — religiosa.
 — Sabina.
 — — *fol. var.*
 — — Scholli.
 — — tamariscifolia.
 — sphærica.
 — squamata (dumosa).
 — tripartita.
 — virgin. Cannaerti.
 — — Bedfordiana.
 — — humilis
 LARIX Kaempferi (ABIES).
 LIBOCEDRUS chilensis (THUJA).
 PICEA amabilis.
 — balsamea prostrata.
 — grandis.
 — pichta (sibirica) (dumosa).
 — pinsapo.
 — taxifolia *pyramidalis*.
 PINUS macrocarpa.
 — palustris.
 — ponderosa.
 — Sabiniana.
 — strobilus cembro.
 — — excelsa himalayensis.
 PODOCARPUS andina.
 — canaliculata.
 — coraiana (coreana) CEPHALOTAXUS (koraiensis).
 — chilina.
 — Harringtonii (CEPHALOTAXUS pedunculata).
 — japonicus (longifolia du Japon).
 — nubigena.
 RETINISPORA ericoïdes (WIDDRINGTONIA).
 SALISBURIA adiantifolia (GINGKO biloba).
 — — *incisa* Rinz (*dissecta*).
 — — *macrophylla laciniata* Sénéclauze.
 SAXE GOTHÆA conspicua.
 — gracilis.

- | | |
|---|--|
| <p>SEQUOIA glauca.
 — sempervirens.
 TAXUS baccata.
 — — <i>ericoides</i>.
 — — <i>Dovastoni (umbraculifera)</i>.
 — — <i>fol. aureo var.</i>
 — — <i>procumbens (stricta)</i>.
 — fastigiata (hibernica).
 — — <i>fol. varieg.</i>
 — imperialis.
 — recurvata.
 THUJA asplenifolia.
 — aurea.
 — caucasica
 — dolabrata.
 — ericoïdes.
 — frenelioides.
 — gigantea.
 — — <i>glauca</i></p> | <p>THUYA hybrida
 — intermedia.
 — Lobbii.
 — meldensis.
 — monstrosa.
 — nepalensis.
 — occid. <i>fol. aureo var.</i>
 — orient. <i>compacta</i>.
 — — <i>fol. aureo var.</i>
 — tatarica.
 — — <i>minor</i>.
 — d'Orient, de diverses forces.
 — d'Occident, idem.
 TORREYA grandis.
 — Myristica.
 WELLINGTONIA gigantea.</p> <p>Ainsi que d'autres conifères de
 pleine terre.</p> |
|---|--|

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

- | | |
|--|---|
| <p>AKEBIA quinata.
 ANDROMEDA augusta.
 — axillaris.
 — calyculata.
 — — <i>angustifolia</i>.
 — Drummundi.
 — floribunda.
 — formosa.
 — pulverulenta.
 — Rollissoni.
 ANTHYLLIS erinacea.
 ARBUTUS Andrachne rotundifolia.
 — californica.
 — Rollissoni.
 — Unedo rubra.
 — — <i>myrtifolia</i>.
 AZALEA amæna de la Chine.
 — Arethusa Rinz, bl. de crème pl.
 — Bartolo Lazzaris R., rouge
 brique clair pl.
 — chromatella R., jaune foncé pl.
 — Dr Streiter R., chamois, clair pl.
 — Graf von Méran R., rose tend. pl.
 — Héroïne R., chamois incar-
 nat pl.
 — Leibnitz R., jaune rougeâtre pl.
 — Maja R., rouge brique pl.
 — Narcissiflora R., jaune souffré
 pl.
 — Ophirie R., jaune clair pl.</p> | <p>AZALEA Rosetta R., blanc et rose pl.
 — une collection de 100 variétés
 de Calendulacea.
 CALYCANTHUS heterophyllus.
 — longifolius.
 — occidentalis (macrophyllus).
 — præcox.
 CLETHRA alnifolia.
 — paniculata.
 DAPHNE Cneorum fol. aureo marg.
 — fol. purpureis.
 EMPETRUM rubrum.
 ERICA.
 KALMIA angustifolia.
 — — fol. luteo marg.
 — — media.
 — — pumila rubra.
 — glauca superba.
 — latifolia.
 — lucida.
 LEDUM latifolium.
 PHILESIA buxifolia.
 RHODODENDRUM alpinum.
 — arboreum Makoyanum.
 — azaleoides album.
 — — Carltoni.
 — — fragrans.
 — — Gowenianum.
 — — roseum.
 — — Torlonianum.</p> |
|--|---|

RHODODENDRUM azaleoïdes *Agamemnon* Rinz (1).

— — *Archiduc Jean* Rinz (1).

— — *Gaerdti* Rinz (1).

— — *Gloria Altenburgensis* R. (1).

— — *Oscar* Rinz (1).

— *californicum* Veitch.

— *campanulatum*.

— — *macranthum*.

— — *Pauline* Demet.

— *catawbiense* *hybridum*.

— — *fastuosum* pl.

— — *præmorsum* fol. var.

— — *Towardii*.

RHODODENDRUM *ciliatum* *præcox*

(1) Ces 5 splendides nouveautés, bien rustiques et à beau feuillage, donnent de gros bouquets odorants, de coloris aussi brillants que dans les plus beaux Azalea de Mortier.

superbum (*ciliatum* *hybridum* fl. violaceo).

— *Clowesianum* Rollisson.

— *dauricum* *atrovirens*

— *fulgens*.

— *hirsutum*.

— *hybridum* fort.

— M^{me} Wagner *Versch*.

— *ponticum* *album*.

— — *multimaculatum*.

— — *atropurpureum*.

— — *caucasicum*.

— — *clethraefolium* varieg.

— — *coccineum*.

— — *flos pictus* Cunningham.

— — fol. albo marg. (*nazarethinum*).

— — fol. aureo var.

— — *Lowii*.

— Prince Camille de Rohan *Versch*.

— *Roylei*.

— *Wallichianum*.

— *Witzoni*.

ROSIER BANKSIANA blanc de Fortune, pour palisser.

— d'Ecosse, 2 variétés, pour pyramide ou palisser.

RIBES GROSSULARIA.

Groseilliers épineux ou à maquereau

1 Achilles Garnet's, blanc.

2 Bribery, vert.

4 Early Yellow, jaune.

6 Bellerophon, rouge.

8 Crown Rob, rouge.

9 Conquering hero, rouge.

11 Fair play, vert.

13 Great Britain, vert.

14 Evergreen, vert.

17 Famous, vert.

18 Friend, vert.

20 Green Anchor, vert.

21 Great Town of Lincoln, rouge.

23 Keepsake, vert.

24 Green Mountain, vert.

25 Green Vale, vert.

27 Green Gascoigne, vert.

28 Green Oak, vert.

29 Hot Ball, vert.

31 Kearsley Hero, rouge.

33 Lancashire Lady, rouge.

34 Navarino, vert.

35 Nelson Wave, vert.

36 Frée Bener, rouge.

38 Champagne, rouge.

39 Rough Robin, rouge.

40 Phénix, rouge.

41 Quen Caroline, blanc.

42 Plough Boy, rouge.

44 Rough, rouge.

45 Sir John, rouge.

46 Swingham, jaune.

47 Rockwood (Prophet) jaune.

48 Troebler Moore's, vert.

55 Warrington, rouge.

57 Green Chisel, vert.

58 Smooth, vert.


59 Ironmonger, rouge.

FRAISIER sir Harry.	VIGNE blanc précoce de Malingre.
— the Adair <i>Elphinstone's</i> .	— Hambourg doré de Stockwood,
— mélange de black Prince ,	à forcer.
trionphe de Liège, Ruby, etc.	— Muscat hâtif de Bronner.
— des Alpes âge d'or, <i>fruit rouge</i>	— Grosse perle blanche.
<i>oblong</i> .	— Lachrima Christi, noir.
— — Legrand, <i>gros fruit rouge</i> .	— petit perlé.
FRAMBOISIER Northumberland fill	— Portugaise, bleu violet.
basket.	-- Trentham black, très-fertile ,
— perpétuel merveille S. L.	énorme grappe noire très-su-
— — — à <i>fruit blanc</i> .	crée dont la maturité n'a lieu
GROSEILLIER cassis black Naples.	qu'en octobre, mais se con-
— à grappes la versaillaise.	servant très-tard.
VIGNE blanc précoce de Kienzheim.	POIRIERS pyramide, <i>forts</i> .
— black Barbarosa de Rivers, à	— en espalier, <i>très-forts</i> .
<i>forcer</i> .	

En outre, une quantité de rares et belles plantes *inédites* ainsi que plusieurs magnifiques **PAEONIA MOUTAN** obtenues de semence dans l'établissement et qui ne sont pas encore nommées.

81





COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer